

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПОЛИСЕГМЕНТАРНОЙ ПНЕВМОНИИ

*Самсонов Н.М., Соболев С.М., Морхат Г.М., Овечкина И.А.,
Мамчур Е.Р., Ращина Е.С.*

По данным И.М. Лаптевой (1998 г.) заболеваемость пневмонией в Республике Беларусь составляет ежегодно примерно 286,5 случаев на 100 тыс. населения, а летальность - 1,1-1,2% с тенденцией к увеличению, что объясняет актуальность проблемы.

Цель исследования - определить частоту основных клинических симптомов при полисегментарных внегоспитальных пневмониях, особенности их течения и лечения.

Место проведения исследования - пульмонологическое отделение стационара ВГТМО №3, кафедра факультетской терапии ВГМУ, г. Витебск, Беларусь.

Материалы и методы исследования - отбор производился случайно, обследовано 34 больных пневмонией (время исследования - 2002 г.), средний возраст 47,5 лет (от 16 до 72), мужчины составили 50% пациентов. Диагноз верифицировался клинически, лабораторно и рентгенологически.

Двусторонняя пневмония была у 17,6%, левосторонняя - у 29,4%, правосторонняя - у 52,9%, из них верхнедолевая - в 5,9% случаев. Все случаи отнесены к тяжелому течению. Парапневмонический плеврит наблюдался у 20,6% больных. Сопутствующие заболевания были у 73,5% больных, злоупотребляли алкоголем - 41,2%. Лихорадка наблюдалась у 100% больных, кашель продуктивный - у 91,2%, непродуктивный - у 8,8%, плевральные боли - у 79,4%, одышка - у 79,4%, тахипноэ - у 100%. Ослабление дыхания аускультативно и притупление перкуторного звука - у 100%, крепитация выслушивалась у 73,5% больных. Полисегментарность поражения подтверждена рентгенологически у всех пациентов. Все пневмонии разрешились как клинико-лабораторно, так и рентгенологически. Средняя длительность лечения составила 26,7 дня.